

Publikationen 2007

Bethanien-Krankenhaus/ Geriatisches Zentrum an der Universität Heidelberg
(Mitarbeiter des Bethanien-Krankenhauses markiert)

Kloos C, Sämann A, Lehmann T, **Braun A**, Heckmann B, Müller UA. Flexible, intensive vs. Conventional insulin therapy in insulin-naive adults with type 2 diabetes – an open label, randomized controlled cross-over clinical trial of metabolic control and patient preference. *Diabetes Care* 2007 Aug 23 [Epub ahead of print]

Braun A, Neumann T, Oelzner P, Hein G, Gröne HJ, Ziemer M, Wolf G. Cryoglobulinaemia type III with severe neuropathy and immune complex glomerulonephritis: remission after plasmapheresis and rituximab. *Rheumatol Int* 2007 Oct 9 [Epub ahead of print].

Hauer K, Oster P. Measuring functional performances in persons with dementia. *J Am Geriatr Soc*. Accepted for publication.

Hüger D, **Zieschang T**, **Schwenk M**, **Oster P**, Becker C, **Hauer K**. Designing studies on the effectiveness of physical training in older adults with cognitive impairment. *Zschr Geriatr Gerontol* accepted for Publication

Kempen GI, Todd,C.J.; Van Haastregt,J..C.; Zijlstra,G.A.; Beyer,N.; Freiburger,E.; **Hauer,K.A.**; Piot-Ziegler,C.; Yardley,L. Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) in older people: results from Germany, the Netherlands and the UK were satisfactory. *Disabil. Rehabil* 2007; 29: 155-62.

Lindemann U, Mucche R, Stuber M, Zijlstra W, **Hauer K**, Becker C. Coordination of strength exertion during the chair-rise movement in very old people. *J Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci.* 2007; 62: 636-40.

Lindemann U, Nadjavi B, Zijlstra W, **Hauer K**, Mucche R, Becker C, Aminian K on behalf of ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe). Distance to achieve steady state walking speed - implications for objective assessment in frail elderly persons *Gait & Posture*, accepted for publication.

Skelton DA, **Hauer K**, Lamb S. Re: 'falls definition validation'. *Age Ageing* 2007; 36: 111-2.

Yardley L, Beyer N, **Hauer K**, McKee K, Ballinger C, Todd C. Recommendations for promoting the engagement of older people in activities to prevent falls. *Qual. Saf Health Care* 2007; 16: 230-4.

Kempen GI, Yardley L, van Haastregt J, Zijlstra R, Beyer N, **Hauer K**, Todd C. The Short FES-I: a shortened version of the Falls Efficacy Scale-International to assess fear of falling. *Age Ageing (in press)*.

Hestermann U, Backenstrass M, Gekle J, Hack M, **Oster P**, Thomas C: Validation of a German version of the confusion assessment method (CAM) for delirium detection. *Psychopathology accepted for publication*

Thomas C, **Hestermann U**, Walther S, Pfueller U, Hack M, **Oster P**, Mundt C, Weisbrod M: Prolonged activation EEG differentiates dementia with and without delirium in frail elderly. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2007 June 19epub.

Großjohann K, **Oster P**. Vorwort zu Menschen mit Demenz im Krankenhaus. *KDA Köln* 2007

Müller M. (2007): Pflegediagnostische Grundlagen. Kapitel für den Studienbrief im Rahmen des Fernlehrgangs "Kontinenzförderung in der Pflege" des Centrums für Kommunikation Information Bildung (CeKIB) am Klinikum Nürnberg.

Müller M. (2007): Maßnahmen zur Kontinenzförderung. Kapitel für den Studienbrief im Rahmen des Fernlehrgangs "Kontinenzförderung in der Pflege" des Centrums für Kommunikation Information Bildung (CeKIB) am Klinikum Nürnberg.

Müller, E. Zieschang T, Dutzi I: Abschlussbericht GISAD für die *Otto und Edith Mühlshlegel Stiftung in der Robert Bosch Stiftung Stuttgart*

Hayder D.; **Kuno E; Müller M:** Kontinenz – Inkontinenz – Kontinenzförderung. Praxishandbuch für Pflegende, *Huber Verlag. In Press.*

[Pfisterer MH, Griffiths DJ, Rosenberg L, Schaefer W, Resnick NM.](#) Parameters of bladder function in pre-, peri-, and postmenopausal continent women without detrusor overactivity. *Neurourol Urodyn.* 2007;26(3):356-61.

Pfisterer M, Johnson T, Jenetzky E, **Hauer K**, **Oster P.** (2007) Urinary incontinence treatment preferences of geriatric patients: a study in hospitalized cognitively competent older adults 80 years and older. *J Am Geriatr Soc* 55: 2016-2022.

Pfisterer M, Hubbe M. (2007) Verträglichkeit von Tolterodin retard 4 mg bei betagten Menschen mit überaktiver Blase –Ergebnisse einer 9-monatigen offenen Beobachtungsstudie in 990 urologischen und allgemeinmedizinischen Facharztpraxen. *Euro J Ger* 9: 191-198

Pfisterer M, Müller E, Oster P, Müller M. Die Situation von PflegeheimbewohnerInnen mit Kontinenzproblemen: eine Studie in 2 deutschen Pflegeheimen. *Z Gerontol Geriat* (in Druck)

Pfisterer M, Fuchs C, Oster P. (2007) Palliativmedizin: Terra incognita der Geriatrie? Palliativmedizin für betagte Patienten. *Geriatric Journal* 1/07: 18-22

Pfisterer M, Bauer J. (2007) PEG bei Demenz. *Kongressband Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie (DGGPP)* (in Druck)

Zieschang T, Müller E, Dutzi I, Hestermann U, Hüger D, Specht-Leible N, Oster P. Akuterkrankte Patienten mit Demenz im Krankenhaus – eine Herausforderung. In: *Adler & Bektas (Hrsg.) Seelische Gesundheit und Lebensqualität im Alter - Ressourcen, Kompetenzen, Behandlungsstrategien, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP), Stuttgart: Kohlhammer* (in Druck)

Zieschang T. Agitiert, desorientiert, verwirrt. *Ärztliche Praxis Neurologie Psychiatrie* 2008, Jan; 46-47.